

島根県水稻主要品種特性データ

種類	晩性	品種名	来歴	供試 年次	試験 場所	播 種 期	移 植 期	出 穂 期	成 熟 期	稈 長	穂 長	穂 数	芒の 多少・長短	ふ 先 色	草 型	穂 発 芽 性	脱 粒 性	心 白 の 多 少	腹 白 の 多 少	玄 米 千 粒 重	10a当り収量			諸抵抗性					適地	栽培適性	概評	
																					全 重	精 粒 重	玄 米 重	葉 い もち	穂 い もち	白 葉 枯 病	紋 枯 病	耐 冷 性			耐 倒 伏 性	優 点
主食用うるち	極早	つきあかり	F1(かばしこ×北陸200号)×北陸208号 〔農研機構〕 (平成27年)	令3 ～ 令7	出雲 赤名	4.01 4.17	4.26 5.12	7.14 7.25	8.16 9.01	81.3 73.6	20.2 19.6	353 327	無 白	黄 重	偏 難	難	無	中	23.7 25.4	1,533 1,515	841 853	659 693	強 強	強 一	中 中	強 中	県内全域	早期栽培	良食味、多収、 穂発芽難、いもち強、耐冷性強	腹白粒が発生しやすい、倒伏		
	極早	コシヒカリ	農林22号×農林1号 〔福井農試〕 (昭和31年)	令3 ～ 令7	出雲 赤名	4.20 4.17	5.10 5.12	7.24 7.30	8.28 9.13	84.2 86.3	18.8 19.3	425 435	稀・短 白	黄 中	難 難	難	無	無	22.6 22.9	1,554 1,652	741 850	527 692	弱 弱	弱 や	中 強	弱 弱	県内全域但し、 肥沃地は避ける	早期又は早植栽培、 多肥栽培は避ける	良食味、多収、 穂発芽難	いもち病弱、耐倒 伏性弱、耐暑性 やや劣る		
	極早	つや姫	山形70号×東北164号 〔山形農総研〕 (平成21年)	令3 ～ 令7	出雲 赤名	4.20 4.17	5.10 5.12	7.25 7.31	8.27 9.15	77.8 73.8	18.9 17.5	447 441	稀・短 白	黄 中	や や	難 難	微	無	22.3 22.6	1,682 1,617	842 889	606 702	やや強 中	中 -	中 中	強 強	県内平坦部	早植栽培～普通 期栽培	良質、良食味、 耐倒伏性強	心白粒がやや発 生しやすい		
	早	きぬむすめ	キヌヒカリ×愛知92号(祭り晴) 〔九州沖縄農研C〕 (平成17年)	令3 ～ 令7	出雲 赤名	4.20 4.17	5.10 5.12	8.09 8.15	9.19 10.00	83.5 83.5	18.9 17.6	435 379	稀・短 白	黄 中	中 中	難 難	無	無	21.9 23.0	2,023 1,818	871 873	636 695	中 中	や や	中 弱	弱 中	平坦～中山間部	早植～普通期裁 培	良食味、良質、 多収	白葉枯病やや弱 耐冷性弱		
酒造好適米	極早	五百万石	菊水×新200号 〔新潟農試〕 (昭和32年)	令3 ～ 令7	- 赤名	- 4.17	- 5.12	- 7.22	- 9.02	- 87.6	- 21.9	- 364	稀・短 白	黄 重	や や	難 難	多	無	- 27.6	- 1,470	- 824	- 632	やや弱 中	や や	中 中	や や	強 弱	山間～中山間部	早期栽培	酒造好適米、早 熟、多収、耐倒伏 性強	耐冷性やや弱 低温発芽性劣る	
	極早	佐香錦	改良八反流×金紋錦 〔島根農試〕 (平成12年)	令3 ～ 令7	- 赤名	- 4.17	- 5.12	- 7.26	- 9.10	- 90.4	- 21.8	- 378	無 白	黄 重	や や	や や	多	中	- 28.1	- 1,556	- 825	- 616	やや弱 中	中 中	一 や	や 弱	中山間部	早期栽培	酒造好適米、早 熟、多収、耐倒伏 性強	いもち病やや弱 耐冷性やや弱		
	早	縁の舞	山田錦×01-66 〔島根農試〕 (平成29年)	令3 ～ 令7	赤名	4.17	5.12	8.11	9.23	93.6	20.8	316	稀・短 白	黄 重	や や	難 難	多	無	29.0	1,538	692	618	弱 弱	弱 一	中 中	や や	や 弱	山間～中山間部	早植栽培、多肥 栽培は避ける	酒造好適米、多 収、良質、大粒、 穂発芽やや難、 耐冷性やや強	いもち病弱 耐倒伏性やや弱	
	中	改良雄町	比婆雄町×近畿33号 〔島根農試赤名分場〕 (昭和35年)	令3 ～ 令7	赤名	4.17	5.12	8.12	9.23	94.4	21.0	365	中・中 白	黄 重	偏 易	や や	難 難	多	無	26.7	1,521	702	570	やや弱 弱	や や	中 中	や 弱	や 弱	山間～中山間 部、肥沃地は避 ける	早植栽培、多肥 栽培は避ける	酒造好適米、良 質	耐倒伏性やや弱 穂発芽性やや易
もち	極早	ココノエモチ	中部26号×稻系糯108 〔愛知山間実験農場〕 (昭和63年)	平27 ～ 令2 ¹⁾	出雲 赤名	4.17 4.15	5.08 5.07	7.25 8.04	8.25 9.09	74.2 69.0	19.3 18.9	379 322	稀・短 赤	偏 褐	難 数	難	-	-	22.1 22.7	1,278 1,195	658 645	483 515	弱 中	や や	や 弱	や 強	強	県内全域	早期栽培	餅質良、多収、 穂発芽難	紋枯病弱	
	早	ミコトモチ	山陰糯83号×中部糯57号 〔島根農技C〕 (平成19年)	平27 ～ 令2 ²⁾	出雲	4.17 -	5.08 -	8.10 -	9.17 -	84.6 -	19.8 -	387 -	中・中	褐 中	中 中	難	-	-	26.2 -	1,528 -	668 -	520 -	やや弱 弱	中 中	一 一	中 中	平坦～中山間 部、標高200m以 下	早植栽培	餅の外観及び食 味良好、多収	葉いもちやや弱 胴切米発生しや すい		

注1) 赤名の「ココノエモチ」は平18～22のデータ。

2) 出雲の「ミコトモチ」は平成29年を除く平27～令2のデータ。

3) 玄米千粒重及び玄米重は、主食用うるちが粒厚1.90mm以上、もちが粒厚1.85mm以上、酒造好適米が粒厚2.0mm以上の水分15%換算値。

島根県麦主要品種特性データ

種類	早晩性	品種名	来歴 〔育成場所〕 (育成年)	採用 年次	供試 年次	播種期	出穂期	成熟期	稈 長	穂 長	穂 数	芒の長短	株の開閉	穂発芽性	脱粒性	播性程度	玄麦				品 質	諸抵抗性										適地	栽培適性	概評		
																	千粒重	容積重	10a当り収量	整粒歩合		黒銹病	小銹病	赤銹病	うどんこ病	赤かび病	縞萎縮病	斑葉病	凍霜害抵抗性	耐寒雪性	耐肥性			耐倒伏性	優点	欠点
			(育成年)			月日	月日	月日	cm	cm	本/m ²					g	g/L	kg	%																	
小麦	中	ミナミノカオリ	Pampa INTA×西海167号 〔九州農試〕 (平成16年)	令3	平16 ～ 平19	11.07	4.13	6.04	81	6.9	474	やや長	閉	やや易	中	I	38.9	801	481	－	上 の 下	/	/	/	やや強	やや弱	強	/	/	/	中	強	平坦部	排水良好な水田転換畑に適する	成熟期早、製パン適性高い	赤かび病やや弱、穂発芽やや易
二条大麦	早	サチホゴールデン	大系R4224×関東二条29号 〔栃木農試〕 (平成17年)	平26	平27 ～ 令1	11.07	3.22	5.12	78	5.5	342	中	やや閉	中	中	I	45.6	737	303	91	上 の 中	－	/	/	強	やや強	強	/	中	/	/	/	平坦部	排水良好な水田転換畑に適する	縞萎縮病、うどんこ病に強い	

注) 供試年次は播種年。「播性程度」はⅠ～Ⅱ(春播性)、Ⅲ～Ⅳ(中間)、Ⅴ～Ⅶ(秋播性)の7段階

島根県大豆主要品種特性データ

種類	早晚性	品種名	来歴	採用年次	供試年次	播種期	開花期	成熟期	生態型	主茎長	主茎節数	分枝数	葉型	伸育型	毛茸の有無及び色	花色	熟莢色	裂莢性	子実					粗蛋白質	粗脂肪	全糖	品質	諸抵抗性				適地	栽培適性	概評		
																			百粒重	粒形	裂皮	種皮色	臍色					10a当り収量	紫斑病	ウィルス	耐倒伏性			蔓化性	優点	欠点
			(育成年)			月日	月日	月日		cm	/株	/株								g				kg	%	%	%									
大豆	中晩生	サチユタカA1号	サチユタカ ⁶ ×ハヤヒカリ	令3	令1	6.15	8.02	11.01	Ⅲc	61.0	14.9	5.9	円	有限	有白	紫	褐	やや難	36.7	楕円体	少	黄	黄	353	45.0	19.8	21.2	中の上	強	中	強	強	県内全域	排水良好な水田転換畑に適する	裂莢しにくい、粗蛋白含量高い	褐斑粒やや発生する
			[作物研究所]		令2	7.30	9.04	11.13		58.5	11.8	3.1							34.9					318	45.7	18.7	21.9									
		タマホマレ	Lee×東山7号(フジミジロ)	昭55	平28	6.16	7.28	11.08	Ⅲc	54.8	13.1	4.8	円	有限	有白	紫	褐	やや易	31.5	球	少	黄	黄	232	42.1	20.0	23.0	中の上	中	中	強	難	県内全域	排水良好な水田転換畑に適する	外観品質極良、機械化適応性高い	粗蛋白含量低い、やや裂皮しやすい
			[長野農試]		令2	7.25	8.31	11.10		56.3	12.4	3.5							30.0					251	42.7	19.5	22.9									

注1 生態型は開花までの日数:Ⅰ(極短),Ⅱ(短),Ⅲ(中),Ⅳ(長),Ⅴ(極長)と結実日数:a(短),b(中),c(長)の組み合わせ

注2 上段:標準播:平28～令2, 下段:密条晩播:平29～令2における成績 サチユタカA1号は上段:標準播:令1～令2, 下段:密条晩播:令1～令2における成績