令和８年２月18日

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、農薬製造者からの申請に基づき、令和８年３月 18 日に使用制限となる変更の登録が予定されておりますので、ご連絡いたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名	変更内容
第 15664 号	オキシンドー水和剤８０	有機銅水和剤	日本農薬株式会社	別紙１
第 18230 号	ドキリンフロアブル	有機銅水和剤	日本農薬株式会社	別紙２
第 21247 号	オキシラン水和剤	キャプタン・有機銅水和剤	日本農薬株式会社	別紙３
第 8086 号	キノンドー水和剤４０	有機銅水和剤	アグロカネショウ株式会社	別紙４
第 14359 号	キノンドー水和剤８０	有機銅水和剤	アグロカネショウ株式会社	別紙５
第 17831 号	キノンドーフロアブル	有機銅水和剤	アグロカネショウ株式会社	別紙６
第 18064 号	キンセット水和剤８０	銅・有機銅水和剤	アグロカネショウ株式会社	別紙７
第 23522 号	キノンドー顆粒水和剤	有機銅水和剤	アグロカネショウ株式会社	別紙８

【 申請者による変更理由 】

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

（別紙１）

オキシンドー水和剤８０

■変更内容

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」、「マルメロ」及び「かりん」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。
- 作物名「なし」について、適用病害虫名「黒斑病、黒星病」の希釈倍数を「1400～2000倍」に、適用病害虫名「輪紋病」の希釈倍数を「1400～1600倍」に変更する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ） 】

［変 更 前］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病、黒点病、斑点落葉病	1200～1600倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）
	輪紋病、すす点病、すす斑病、褐斑病、炭疽病	1200倍					
マルメロ、かりん	黒点病	1200～2000倍					4回以内
なし	黒斑病、黒星病	1200～2000倍		収穫3日前まで	9回以内		12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）
	輪紋病	1200～1600倍					

［変 更 後］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、黒星病	1400～2000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	9回以内	散布	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）
	輪紋病	1400～1600倍					

（別紙２）

ドキリンフロアブル

■変更内容

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

➢ 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ） 】

［変 更 前］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、黒星病、輪紋病、枝枯細菌病	1000 倍	200～700L/10a	収穫 3 日前まで	9 回以内	散布	12 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 9 回以内）

［変 更 後］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、黒星病、輪紋病、枝枯細菌病	1000 倍	200～700L/10a	収穫 21 日前まで	9 回以内	散布	12 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 9 回以内）

（別紙３）

オキシラン水和剤

■変更内容

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」の希釈倍数を「700～800倍」に変更し、「500～600倍」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ） 】

［変更前］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒点病、斑点落葉病、黒星病、輪紋病	500～800 倍	200～700L/10a	収穫 14 日前まで	4 回以内	散布	6 回以内	7 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 4 回以内）
	褐斑病、すす点病、すす斑病、炭疽病	500～600 倍						
なし	黒星病、黒斑病、輪紋病	500～600 倍		収穫 3 日前まで	9 回以内		9 回以内	12 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 9 回以内）
	炭疽病、褐色斑点病、黒斑細菌病	500 倍						

［変更後］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒点病、斑点落葉病、黒星病、輪紋病	700～800 倍	200～700L/10a	収穫 14 日前まで	4 回以内	散布	6 回以内	7 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 4 回以内）
なし	黒星病、黒斑病、輪紋病	500～600 倍		収穫 21 日前まで	9 回以内		9 回以内	12 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 9 回以内）
	炭疽病、褐色斑点病、黒斑細菌病	500 倍						

（別紙４）

キノンドー水和剤４０

■変更内容

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。
- 作物名「なし」の希釈倍数「600～800倍」を「700～800倍」に変更する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ） 】

［変 更 前］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病、斑点落葉病、黒点病	500～800 倍	200～700L/10a	収穫 14 日前まで	4 回以内	散布	7 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 4 回以内）
なし	黒斑病、黒星病	800～1000 倍		収穫 3 日前まで	9 回以内		12 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 9 回以内）
	輪紋病	600～800 倍					

［変 更 後］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、黒星病	800～1000 倍	200～700L/10a	収穫 21 日前まで	9 回以内	散布	12 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 9 回以内）
	輪紋病	700～800 倍					

（別紙５）

キノンドー水和剤８０

■変更内容

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」、「マルメロ」及び「かりん」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。
- 作物名「なし」の希釈倍数「1200～2000倍」を「1400～2000倍」に変更し、「1200倍」を削除する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ） 】

［変 更 前］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病、斑点落葉病	1200～1600 倍	200～700L/10a	収穫 14 日前まで	4 回以内	散布	7 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 4 回以内）
	輪紋病、褐斑病、炭疽病、すす斑病、すす点病、黒点病	1200 倍					
なし	黒星病、黒斑病	1200～2000 倍		収穫 3 日前まで	9 回以内		12 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 9 回以内）
	輪紋病	1200 倍					
マルメロ かりん	黒点病	1200～2000 倍		収穫 14 日前まで	4 回以内		4 回以内
	ごま色斑点病	1200 倍					

［変 更 後］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒星病、黒斑病	1400～2000 倍	200～700L/10a	収穫 21 日前まで	9 回以内	散布	12 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 9 回以内）

（別紙６）

キノンドーフロアブル

■変更内容

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

➢ 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ） 】

［変 更 前］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、輪紋病、黒星病、褐色斑点病	1000 倍	200～700L/10a	収穫 3 日前まで	9 回以内	散布	12 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 9 回以内）

［変 更 後］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、輪紋病、黒星病、褐色斑点病	1000 倍	200～700L/10a	収穫 21 日前まで	9 回以内	散布	12 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 9 回以内）

（別紙７）

キンセット水和剤８０

■変更内容

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ） 】

［変 更 前］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	銅を含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病、輪紋病、褐斑病、炭疽病	1000～1200倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	－	7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）
なし	輪紋病、黒星病			収穫3日前まで	9回以内		－	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）

［変 更 後］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	銅を含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	輪紋病、黒星病	1000～1200倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	9回以内	散布	－	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）

（別紙８）

キノンドー顆粒水和剤

■変更内容

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ） 】

［変 更 前］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病、黒星病、輪紋病、褐斑病、すす点病、すす斑病、黒点病、炭疽病	1000 倍	200～700L/10a	収穫 14 日前まで	4 回以内	散布	7 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 4 回以内）
なし	黒星病、黒斑病、輪紋病			収穫 3 日前まで	9 回以内		12 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 9 回以内）

［変 更 後］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒星病、黒斑病、輪紋病	1000 倍	200～700L/10a	収穫 21 日前まで	9 回以内	散布	12 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 9 回以内）