


2026 年 7 月 宍道湖 塩分・溶存酸素




水域	調査日	天候	風向風速	水温 (表層平均)
宍道湖	2026 年 7 月 6 日	雨	東南東 0.8 m/秒 →西 5.3 m/秒	25.2 °C

● 調査地点 — 鉛直ライン




調査定点図

● 塩分 水平分布 (表層:左、底層:右)





※塩分のスケールは 2020 年 6 月より変更となっています。過去と比較する際はご注意ください。

● 塩分 鉛直分布




塩分の平均は、表層、底層ともに先月に比べて低下し、平年並みの水準。表層では西部北岸を中心に低い水域があるものの、その他は 5PSU 以上。底層は、6～9PSU の水域が広がっていた。
(『R8 年度水質状況』を参照)。

● 溶存酸素 水平分布(底層:左)と鉛直分布(右)



宍道湖

100%
80%
60%
40%
20%
0%

■ 貧酸素化水の体積割合

先月の同様に 3.0mg/l を下回る貧酸素水塊の体積割合は 0.9%と低い、底層に広範囲に薄く広がっていた。

溶存酸素の平均値は 4.0mg/l であり、先月よりは上昇したものの平年並みであった。


(『R8 年度水質状況』を参照)。

● R8年度水質状況


宍道湖

水温
(表層平均)


水温(°C)

塩分
(表層平均)

塩分(P S U)

塩分
(底層平均)

塩分(P S U)

貧酸素水
体積割合

貧酸素水割合(%)

