

貝毒成分・環境調査モニタリング

(魚介類環境調査事業)

堀 玲子

1. 研究の目的

貝毒発生情報を迅速に提供し、貝毒による被害を未然に防ぐため、貝毒の発生が予想される海域において、環境調査を実施した。

2. 調査方法

調査は、出雲、石見、隠岐の3海域で実施し、観測および試水の採取を出雲海域は松江市鹿島町の恵曇漁港内（水深5m）、石見海域は浜田市の浜田漁港内（水深8m）、隠岐海域は西ノ島浦郷湾内の栽培漁業部棧橋突端部（水深13m）の3地点で行った。

観測項目は、天候、風向、風力、水温、透明度（透明度板）、水色（水色計）、測定項目は比重（赤沼式比重計により塩分に換算）、溶存酸素（溶存酸素計）、毒化プランクトンの種類及び細胞数、優占プランクトン属名（試水を1ℓ採水し、中性ホルマリンにより固定後孔径5 μ mのメンブランフィルターを用いて約50mlに濃縮後検鏡）とした。

また、保健環境科学研究所においてイワガキ、ムラサキイガイ及びヒオウギガイの貝毒検査（公定法によるマウス毒性試験）を実施した。

3. 調査結果

(1) 水質

水温は出雲海域では4～8月および翌年2～3月の調査期間中11.8～27.6 $^{\circ}$ C、石見海域では4～8月の間13.5～28.6 $^{\circ}$ C、隠岐海域は4月から翌年3月の間12.5～29.4 $^{\circ}$ Cで推移した。塩分は出雲海域で7月25日の表層で降雨による塩分の低下が見られた。溶存酸素は問題となる貧酸素状態は見られなかった。

(2) 貝毒プランクトンの発生状況

①麻痺性貝毒プランクトン

全海域において出現しなかった。

②下痢性貝毒プランクトン

Dinophysis acuminata

石見海域で7月中旬に出現し、最高細胞数は7月11日の0.1cells/mlであった。

Dinophysis fortii

石見海域で7月中旬に出現し、最高細胞数は7月11日の0.1cells/mlであった。

Dinophysis caudate

隠岐海域で7月下旬に出現し、最高細胞数は7月24日の0.05cells/mlであった。

(3) 貝毒検査結果

麻痺性貝毒・下痢性貝毒ともに、全ての海域で規制値を超える発生事例はなかった。規制値以下の発生事例は、隠岐海域のヒオウギガイにおいて麻痺性貝毒が中腸腺で2.05～4.66MU/g検出された。