



ケンサキイカ（地方名：マイカ、シロイカ）の各地の漁況と底層水温情報を6県（長崎県、佐賀県、福岡県、山口県、島根県、鳥取県）で共同発行しましたので、お知らせします。

## I. 9月のイカ釣り漁況

### ① 各県の主要漁港における9月の水揚量について（平年は直近の過去5年平均）。

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| 鳥取県 | 主要漁港の水揚量は、前年、平年を上回りました（前年比 117%、平年比 141%）。     |
| 島根県 | 主要漁港の水揚量は、前年を下回り、平年を上回りました（前年比 81%、平年比 462%）。  |
| 山口県 | 代表2地区の水揚量は、前年を下回り、平年を上回りました（前年比 88%、平年比 140%）。 |
| 福岡県 | 代表港の水揚量は、前年、平年を下回りました（前年比 59%、平年比 78%）。        |
| 佐賀県 | 標本漁港の水揚量は、前年、平年を上回りました（前年比 172%、平年比 121%）。     |
| 長崎県 | 標本漁協の水揚量は、前年、平年を下回りました（前年比 21%、平年比 24%）。       |

※前年・平年比の評価は、90%以下では「下回る」、91%から109%では「並み」、110%以上では「上回る」としています。

### ② 各県の「1日1隻当たりの漁獲量（CPUE）の月別動向」と「9月の漁獲サイズ」について




図1 各県のCPUE（折れ線グラフ）および漁獲サイズの割合（円グラフ）  
※鳥取県のみ漁獲量で表示

## Ⅱ. 10月上旬の底層水温

|     |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 鳥取県 | 陸棚上（水深 26～97m）の底層水温は 14.3～24.5℃でした。                           |
| 島根県 | 陸棚上の底層水温は時化の影響で 1 定点しか観測できず、6.4℃（139m）でした。                    |
| 山口県 | 陸棚上（65～139m）の底層水温は 9.7～22.8℃でした。                              |
| 福岡県 | 沖合の底層水温は 17.3～20.4℃で、平年並みでした。                                 |
| 佐賀県 | 壱岐水道の底層水温は 24.4～25.5℃、対馬東水道は 16.1～24.1℃で、平年値と比べ±0.0～+3.4℃でした。 |
| 長崎県 | 10月の五島西沖での底水温観測はありません。                                        |




図2 長崎県～鳥取県の沿岸域・沖合域における底層の水温分布図

図中の丸（●）は観測点を、メートル（m）の単位がついている数字は水深を、単位がついていない数字は水温（℃）を示しています。

※モノクロ印刷の場合、水温帯の色の識別が困難ですので、ホームページでカラー版をご覧ください。