


安定ヨウ素剤とは何ですか？

原子力災害時に国または県や市の指示に基づき避難等に合
わせて服用する医薬品です。

事故が発生したときにも配布することとしています。



丸剤 (3歳以上)



ゼリー剤 (3歳未満)

どのような効果があるのですか？

放射性ヨウ素による内部被ばくを抑える効果があります。

- 原子力災害時に、原子力発電所から周囲に放出される主要な放射性物質の一つに「放射性ヨウ素」があります。
- 安定ヨウ素剤を前もって飲んでおくことにより、この放射性ヨウ素が甲状腺にたまることを防ぎます。
- また、安定ヨウ素剤の効果は、服用後24時間とされています。



どんな被ばくにも、効果があるのですか？

安定ヨウ素剤はすべての被ばくを予防する万能薬ではありません。

- 防護効果は放射性ヨウ素による内部被ばくに限られます。

安定ヨウ素剤には使用期限がありますか？

- 安定ヨウ素剤の使用期限は、丸剤は製造後5年、ゼリー剤は製造後3年です。
- 使用期限が近づいた時点で配布会を行い、新しい安定ヨウ素剤と交換します。

いつ服用するのですか？

- 安定ヨウ素剤の服用は、国または県や市が広報を通じて指示します。
- 原子力災害時に、安定ヨウ素剤を効果的に利用するためには、服用のタイミングが大変重要です。必ず指示にしたがって服用してください。また、指示があるまで決して服用しないでください。



副作用はありますか？

- 安定ヨウ素剤を飲んだ時に、まれに副作用（一般的な過敏症や、嘔吐、下痢、頭痛、息切れなど）が起こる場合があります。
- 服用する際には通常の医薬品と同様に注意してください。

