

表2 水稲作況試験収量および品質調査結果の概要

令和7年10月7日現在

農業技術センター作物科

調査項目										飯南					
	つきあかり (4/25植)			つや姫 (5/10植)			コシヒカリ (5/10植)			きぬむすめ (5/10植)			コシヒカリ (5/1植)		
	本年	平年	平年比 (平年差)	本年	平年	平年比 (平年差)	本年	平年	平年比 (平年差)	本年	平年	平年比 (平年差)	本年	平年	平年比 (平年差)
穂 数 (本 / m ²)	317	363	87	415	439	95	438	394	111	424	411	103	384	389	99
有 効 茎 歩 合 (%)	91.9	83.0	111	88.7	75.7	117	75.7	65.1	116	76.1	64.2	118	72.7	64.0	114
1 穂 粳 数 (粒)	106.8	97.1	110		82.2			75.9			93.1			73.6	
m ² 粳数 (粒 / m ² *100)	338	352	96		357			297			379			296	
登 熟 歩 合 (%)	87.2	79.9	109		75.4			74.0			73.6			87.0	
玄 米 千 粒 重 (g)	23.5	23.8	99		22.0			22.8			22.3			22.9	
全 重 (kg/a)	160.0	154.3	104		161.0			144.8			189.2			138.1	
わ ら 重 (kg/a)	63.6	60.7	105		73.5			69.3			97.1			60.4	
精 粳 重 (kg/a)	87.2	86.6	101		82.8			70.7			85.2			73.1	
屑 米 重 (kg/a)	2.5	3.3	75		8.8			6.4			9.4			3.4	
精 玄 米 重 (kg/a)	69.3	66.3	105		58.8			49.5			61.2			57.9	
整 粒 歩 合 (%)		65.3			65.9			59.0			71.5			74.6	
未 熟 粒 歩 合 (%)		31.4			32.5			36.8			27.3			10.7	
胴 割 粒 歩 合 (%)		0.83			0.64			0.49			0.04			4.5	
乳 白 粒 率 (%)		3.8			0.4			5.8			4.0			4.7	
検 査 等 級	2等下			2等上			2等中			1等下			2等上		

注1) 収量及び収量構成要素の平年値は出雲前10ヶ年の平均値。「つきあかり」は前6ヶ年の平均値。
注2) 「つきあかり」「つや姫」「コシヒカリ」「きぬむすめ」「コシヒカリ(赤名)」の元肥窒素施用量はそれぞれ4、4、2、3.5、2.5kg/10a。
「つきあかり」「つや姫」「コシヒカリ」「きぬむすめ」「コシヒカリ(赤名)」の総窒素施用量はそれぞれ8、7、5、10、5kg/10a。「つや姫」は特別栽培基準による施肥。
注3) 精玄米は1.90mm縦目篩で選別、水分15%換算値。
注4) 整粒歩合、未熟粒歩合、胴割粒、乳白粒は穀粒判別器による調査。「つや姫」「コシヒカリ」「きぬむすめ」は前8ヶ年、「つきあかり」は前6ヶ年の平均値。
注5) 検査等級は日本穀物検定協会による。