

表1 水稲作況試験生育調査結果の概要

令和8年6月12日

農業技術センター作物科

	出雲												飯南		
	つきあかり (4/25植)			つや姫 (5/10植)			コシヒカリ (5/10植)			きぬむすめ (5/10植)			コシヒカリ (5/1植)		
	本年	平年	平年比 (平年差)	本年	平年	平年比 (平年差)	本年	平年	平年比 (平年差)	本年	平年	平年比 (平年差)	本年	平年	平年比 (平年差)
苗乾物重(mg)	16.7	18.3	92	18.9	15.1	126	16.2	13.7	118	18.1	13.6	133	12.8	10.9	117
移植時	2.4	2.3	0.1	2.2	2.1	0.1	2.1	2.1	0.0	2.1	2.0	0.1	2.4	2.3	0.2
+20日	5.2	5.0	0.2	6.7	5.6	1.1	6.5	5.5	1.0	6.3	5.3	1.0	7.4	6.4	1.0
+30日	7.6	6.8	0.8	8.4	7.5	0.9	8.3	7.3	1.0	8.2	7.0	1.2	8.5	7.9	0.6
+40日	9.3	8.6	0.7		9.0			8.8			8.6				
+50日	10.3	9.9	0.3		10.0			9.8			9.8				
+60日		11.1			11.2			11.0			10.8				
+70日		12.2			12.2			12.1			11.8				
+80日								12.3			13.0				
+90日											13.4				
止葉葉位		12.6			12.4			13.4							
移植時	12.2	12.2	100	13.6	12.1	112	12.3	12.4	99	11.3	13.0	87	14.2	11.4	125
+20日	22.4	23.9	94	28.3	23.9	118	26.5	23.4	113	24.4	23.6	103	27.7	22.8	121
+30日	31.4	30.1	104	38.6	28.2	137	37.2	27.4	136	33.1	26.5	125	34.4	27.7	124
+40日	50.5	39.1	129		44.8			42.7			40.7				
+50日	68.2	54.6	125		57.2			55.3			51.7				
+60日		72.0			72.0			69.3			69.1				
+70日		85.3			83.1			82.5			81.5				
+80日					95.6			99.0			94.5				
+90日											103.9				
移植時	56	56	100	56	56	100	89	89	100	89	89	100	67	67	100
+20日	65	64	101	224	155	145	319	205	156	236	187	126	213	204	105
+30日	203	158	129	464	329	141	523	405	129	476	380	125	307	356	86
+40日	377	285	132		543			607			603			547	
+50日	483	410	118		572			609			634			547	
+60日		423			539			563			601			611	
+70日		396			495			493			534			562	
+80日											483			510	
+90日											451			467	
(SPAD値)	43.9	41.8	2.1		44.0			40.2			39.9		41.0	38.3	2.7
+40日	43.0	43.9	-0.9		41.4			36.7			36.9			39.0	
+50日		43.2			40.9			33.9			35.3			38.2	
+60日		43			39.0			34.4			35.2			36.0	
+70日					38.6			36.1			35.2			34.8	
+80日											35.2			34.3	
+90日															
最高茎数(本/m <sup>2</sup> )		427			577			626			557			601	
幼穂形成期		6.21			7.02			7.04			7.14			7.04	
出穂期		7.15			7.25			7.26			8.09			7.29	
成熟期		8.16			8.28			8.28			9.17			9.06	
穂数(本/m <sup>2</sup> )		356			415			399			411			384	
稈長(cm)		79.2			76.5			82.3			83.9			80.3	
穂長(cm)		20.3			18.5			19.0			18.8			18.6	

注1) 平年値は前10ヶ年の平均値。4/25植「つきあかり」は前7ヶ年の平均値。

注2) 「つきあかり」「つや姫」「コシヒカリ」「きぬむすめ」「コシヒカリ(赤名)」の元肥窒素施用量はそれぞれ4、4、2、3.5、2.5kg/10a。

「つきあかり」「つや姫」「コシヒカリ」「きぬむすめ」「コシヒカリ(赤名)」の総窒素施用量はそれぞれ8、7、5、10、5kg/10a。「つや姫」は特別栽培基準による栽培。

注3) 栽植密度は22.2株(株間15cm、条間30cm)、1株4本植え。ただし、「飯南コシヒカリ」は1株3本植え、「つきあかり」及び「つや姫」は栽植密度18.5株(株間18cm、条間30cm)・1株3本植え。